


	SOINS DE BOUCHE D'UN PATIENT	PRT.SOIN.07
		Version : 2
		Pages : 1 sur 2
		Mise en application : 18/04/2018
Rédacteur : C. GILARDINO Fonction : Cadre de santé Date : 18/04/2018 Visa : 	Vérificateur : N. POLETTI Fonction : IDE Hygiéniste Date : 18/04/2018 Visa : 	Approbateur : L. FARGIER Fonction : Directrice des Soins Infirmiers Date : 18/04/2018 Visa : 

I. Objet

Ce protocole décrit comment assurer l'hygiène et le confort de la personne soignée, maintenir l'intégrité de la muqueuse buccale et éliminer les sécrétions.

II. Domaine d'application

Ce protocole s'applique aux patients bénéficiant de soins de bouche à domicile.

III. Références réglementaires et normatives

- Décret d'actes et d'exercice infirmier N°2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

IV. Responsabilités

Ce protocole est sous la responsabilité des IDE, soin délégable aux Aides-soignants.

V. Déroulement du protocole

5.1. Matériel

- Blouse à usage unique
- Gants à usage unique
- Bâtonnets de soin de bouche ou compresses non stériles
- Solution de badigeonnage : eau additionnée d'un dentifrice, par exemple en comprimé
- Bassin réniforme
- Verre
- Abaisse langue

5.2. Recommandations

- Ne pas utiliser de pince.
- Appliquer les thérapeutiques locales prescrites après le soin de bouche.

Répéter les soins de bouche 2 à 3 fois par jour minimum.



5.3. Méthode

- Friction mains au Produit Hydroalcoolique
- Enfiler la blouse
- Mettre les gants
- Faire rincer la bouche avant le soin si possible

Si le patient le permet, possibilité de lui demander de faire un gargarisme.

- Si la personne soignée possède une prothèse dentaire :
 - L'enlever à l'aide d'une compresse,
 - La brosser avec du dentifrice
 - La laver à l'eau courante,
 - La placer dans un verre contenant eau + bicarbonate (cp dentifrice)
- Tremper le bâtonnet ou la compresse dans la solution de badigeonnage
- Pour certaines personnes soignées, il est plus facile de faire les soins de bouche sans bâtonnet : utiliser alors un gant à usage unique non stérile en enroulant la compresse imprégnée d'eau bicarbonatée autour de l'index et en procédant comme suit
- Nettoyer dans l'ordre suivant :
 - Les gencives
 - L'intérieur des joues
 - Le palais
 - La langue
- Changer la compresse pour chaque partie
- Terminer le soin en lui appliquant une huile alimentaire sur les lèvres
- Remettre la prothèse dentaire si besoin
- Réinstaller la personne soignée
- Eliminer les déchets (filière DAS)
- Retirer les gants et la blouse
- Si mains souillées lavage de mains, sinon SHA

5.4. Evaluation - Transmissions

Sur le dossier de soins :

- Noter l'état général de la personne soignée, son niveau de participation
- Noter l'état de la muqueuse buccale

Transmission téléphonique

Transmettre toute anomalie ou changement dans l'état de la personne soignée à domicile.

Contactez le médecin traitant si nécessaire

VI. Annexes :

Sans objet