



	INJECTION D'INSULINE	PRT.SOIN.18
		Version : 2
		Pages : 1 sur 2
		Mise en application : 18/04/2018
Rédacteur : C. GILARDINO Fonction : Cadre de santé Date : 18/04/2018 Visa : 	Vérificateur : N. POLETTI Fonction : IDE Hygiéniste Date : 18/04/2018 Visa : 	Approbateur : L. FARGIER Fonction : Directrice des Soins Infirmiers Date : 18/04/2018 Visa : 

I. Objet

Ce protocole décrit les modalités d'injection d'insuline à une personne soignée à domicile suivant la prescription médicale .

II. Domaine d'application

Ce protocole s'applique aux patients diabétiques de type 1 insulino-dépendants et les diabétiques de type 2 insulino-requérants.

III. Références réglementaires et normatives

- Référentiels de bonnes pratiques actualisés SFD Paramédical, Surveillance glycémique et technique d'injection d'insuline et des analogues du GLP1, Société Francophone du Diabète-Paramédical, mars 2017

IV. Responsabilités

Ce protocole est sous la responsabilité des IDE.

V. Déroulement du protocole

5.1. Matériel

- Antiseptique
- Compresses stériles ou tampons stériles
- Seringue à insuline ou stylo avec cartouche dosée à 100 UI/ml
- Flacon d'insuline prescrit

5.2. Recommandations

Connaître la concentration de l'insuline utilisée.

Sortir l'insuline du réfrigérateur ½ heure avant la première utilisation du flacon.

Conserver les flacons non entamés au réfrigérateur.

Laisser le flacon entamé à température ambiante.

Protéger le bouchon du flacon entamé à l'aide d'une compresse.

Noter en clair la date de la première utilisation sur le flacon.

Effectuer une rotation des sites d'injection.

5.3. Méthode

Appliquer le protocole « Conduite à tenir lors de tout soin à domicile ».

5.3.1. *Temps hygiénique*

- Désinfection des mains avec solution hydroalcoolique.
- Agiter le flacon d'insuline.
- Faire l'antisepsie du flacon d'insuline avec l'antiseptique et une compresse stérile.
- Prélever dans le flacon avec la seringue la quantité d'insuline nécessaire suivant prescription.
- Faire un pli cutané et injecter perpendiculairement à la peau.
- Essuyer la peau avec une compresse.
- Eliminer le matériel souillé.
- Désinfection des mains avec solution hydroalcoolique.

5.3.2. *Avec le stylo*

- Désinfection des mains avec solution hydroalcoolique.
- Adapter l'aiguille à la cartouche à l'intérieur du stylo.
- Sélectionner la dose à l'aide du compteur suivant la prescription.
- Purger le stylo.
- Procéder à l'injection comme précédemment.

5.4. Evaluation - Transmissions

Sur le dossier de soins :

- Noter l'état général de la personne soignée
- Noter le site d'injection
- Noter la dose d'insuline administrée
- Noter si l'on observe une lipodystrophie
- Noter si le site d'injection est douloureux

Transmission téléphonique :

Transmettre toute anomalie ou changement de l'état de la personne soignée à domicile.

Contactez le médecin traitant si nécessaire.

5.5. Déchets

Eliminer les objets piquants, coupants et tranchants via la filière conteneurs DASRI.

VI. Annexes :

Sans objet