



	SUIVI D'UNE RADIOTHERAPIE	PRT.SOIN.32
		Version : 2
		Pages : 1 sur 2
		Mise en application : 18/04/2018
Rédacteur : C. GILARDINO Fonction : Cadre de santé Date : 18/04/2018 Visa : 	Vérificateur : N. POLETTI Fonction : IDE Hygiéniste Date : 18/04/2018 Visa : 	Approbateur : L. FARGIER Fonction : Directrice des Soins Infirmiers Date : 18/04/2018 Visa : 

I. Objet

Ce protocole décrit les modalités de suivi d'une radiothérapie, de manière à contrôler la tolérance à l'irradiation et prendre en charge les éventuels effets secondaires.

II. Domaine d'application

Ce protocole s'applique aux patients sous traitement de radiothérapie.

III. Références réglementaires et normatives

- Décret d'actes et d'exercice infirmier N°2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

IV. Responsabilités

Ce protocole est sous la responsabilité des IDE.

V. Déroulement du protocole

5.1. Principale complication aigue

- **Cutanées** : du simple érythème à l'ulcération.
- **Radio mucite ORL** : sécheresse buccale, modification du goût, difficultés de déglutition, mucite.

5.2. Conseils avant irradiation

Cutanés :

- Laver la peau à l'eau ou avec un savon très dilué type lactacyd
- Sécher sans frotter, méticuleusement
- Ne pas appliquer sur la peau : alcool, eau de toilette, parfum, éther, talc, sparadrap
- Ne pas gratter ni frotter la peau
- Eviter l'exposition solaire
- Ne pas raser de près, et si possible avec un rasoir électrique
- Porter des vêtements en coton



Radiomucite :

- Arrêter tabac et alcool
- Eviter les aliments épicés, alcoolisés, acides, les agrumes
- Avoir une hygiène buccale rigoureuse avec une brosse à dent souple

5.3. Conseils pendant irradiation

Cutanés :

- Application de bialfine sur la peau irradiée APRES les séances
- Pommade à base de corticoïdes si aspect inflammatoire
- Eosine et séchage si exsudation
- Ne pas prendre de médicaments photosensibilisants

Radiomucite :

- Bains de bouche après et entre les repas
- Xylocaïne gel si douleur
- Gel fluoré appliqué à l'aide d'une gouttière quotidiennement
- Antalgiques si besoin

VI. Annexes :

Sans objet